

Petit gibier sédentaire de plaine Une étude départementale sur le lièvre

La Fédération des chasseurs du NORD se lance dans une collecte à grande échelle, des pattes antérieures de lièvres.

Les populations de lièvres fluctuent d'une année à l'autre en fonction de multiples paramètres. Ces variations sont très souvent liées à la qualité de la reproduction.

Afin que vous puissiez mieux comprendre les variations des effectifs de lièvres au cours des saisons de chasse, la FDC 59 s'investit pour vous et avec vous dans le suivi de la reproduction.

Cette méthode est basée sur la détection d'un cartilage de conjugaison situé sur le cubitus du jeune lièvre. Ce cartilage correspond à une petite excroissance proche de l'extrémité du cubitus. Cette excroissance s'atténue progressivement mais reste décelable jusque l'âge de 6 à 7 mois.

Chaque patte récoltée est ensuite radiographiée, ce qui permettra de déterminer après lecture, s'il s'agit d'un jeune de l'année ou d'un adulte. Les bilans de ces analyses seront restitués lors des sous commissions de PGCA.

Pour plus d'informations: Ivanic Philippe
Service technique FDC 59 Tel:06/08/57/04/51
ou Pivanic@chasse 59.net

Comment participer au suivi des populations

- Couper la patte 5 cm au-dessus de l'articulation du poignet (comme l'indique le schéma ci-dessous)
- La congeler dans un sac ou une enveloppe en notant la commune de prélèvement ainsi que la date.
- Contacter l'agent ou le technicien du secteur qui se chargera de l'acheminement des échantillons à la FDC.

- **Attention**
- **Ne pas couper trop court la patte (au moins une longueur de 5 cm sur le cubitus)**
- **1 Seule patte par individu**

